

768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych²⁾

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mie-

szanek paszowych dietetycznych (Dz. U. Nr 71, poz. 479) w załączniku pozycja „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej” otrzymuje brzmienie:

Przeznaczenie	Istotne właściwości pokarmowe	Gatunek lub kategoria zwierząt	Dodatkowe wymagania, jakie powinno spełniać oznakowanie	Zalecenia, zgodnie z którymi mają być stosowane
1	2	3	4	5
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej	Niska zawartość wapnia	Krowy mleczne	— zawartość wapnia, — zawartość fosforu, — zawartość magnezu	Zalecany czas stosowania: — od 1 do 4 tygodni przed terminem porodu, — wskazanie w instrukcji użycia: „Zaprzestać podawania po porodzie.”
	lub niska proporcja kationy/aniony		— zawartość wapnia, — zawartość fosforu, — zawartość sodu, — zawartość potasu, — zawartość chlorków, — zawartość siarki	
	lub wysoki poziom zeolitów (syntetycznych glinokrzemianów sodu)		— określenie zawartości syntetycznego glinokrzemianu sodu	Zalecany czas stosowania: — 2 tygodnie przed terminem porodu, — wskazanie w instrukcji użycia: „Ograniczyć ilość paszy, aby dzienna dawka nie przekraczała 500 g glinokrzemianu sodu na zwierzę.”, „Zaprzestać podawania po porodzie.”

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

²⁾ Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/4/WE z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 94/39/WE w odniesieniu do pasz mających zapobiegać wystąpieniu gorączki wywołanej zastożem mleka (Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2008, str. 4).

1	2	3	4	5
	lub wysoki poziom wapnia w postaci łatwo dostępnych soli wapniowych		— ogólna zawartość wapnia, — źródła wapnia wraz z określeniem jego zawartości	Zalecany czas stosowania: „Stosować od pierwszych symp- tomów porodu i stosować przez dwa dni po jego zakończeniu.”, — wskazanie na opakowaniu, po- jemniku lub etykiecie: „Przed użyciem zalecane jest zasięgnięcie opinii eksperta w zakresie żywienia.”, — w instrukcji użycia należy okre- ślić dawkowanie oraz czas sto- sowania przed porodem i po jego zakończeniu

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *M. Sawicki*